

## Recomandări de testare

### Criterii clinice

Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome:

- tuse
- febră
- scurtarea respirației
- debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei

**Nota: pentru copiii cu vârstă până la 16 ani** care prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2.

### Recomandări de prioritizare a testării prin RT-PCR și/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2

- A. **Persoane vaccinate împotriva SARS-CoV-2 cu schema completă, precum și cele care au trecut prin boala, documentată cu bilet de externare din spital și/sau buletinul de analiză cu rezultat pozitiv, dar la care au trecut mai puțin de 180 zile de la data primului test pozitiv:**
- a. persoane simptomatice **conform definiției de caz:** test rapid antigenic sau RT-PCR
  - b. persoane simptomatice cu rezultat negativ la testul rapid antigenic efectuat în unități sanitare: RT-PCR
- B. **Persoane nevaccinate împotriva SARS-CoV-2, persoane cu schema de vaccinare incompletă, persoane care au trecut prin boală, dar la care au trecut mai mult de 180 zile de la data primului test pozitiv, persoane care nu au avut niciodată boala**
- a. persoane simptomatice: test rapid antigenic
  - b. persoane simptomatice cu rezultat negativ la testul rapid antigenic efectuat în unități sanitare : RT-PCR
  - c. contacți direcți ai cazurilor confirmate, în ziua a 3-a - a 5-a de la contact, inclusiv personalul medico-sanitar și auxiliar
  - d. alte categorii:
    - i. cu 48 de ore înainte
      1. procedură de transplant – RT-PCR
      2. internare la pacienți cu imunosupresie – RT-PCR/test antigenic rapid
      3. radioterapie/chimioterapie/intervenții chirurgicale la pacienți oncologici – RT-PCR/test antigenic rapid
    - ii. în ziua internării sau cu 24 ore înainte - însoțitorii pacienților copii cu diagnosticul de mai sus – test antigenic rapid
    - iii. pacienți hemodializați – de 2 ori/lună - RT-PCR/test antigenic rapid
    - iv. săptămânal
      1. persoane instituționalizate asimptomatice – test rapid antigenic
      2. personalul de îngrijire din centre rezidențiale – test rapid antigenic
    - v. gravide carantinate – test rapid antigenic